

カメムシのにおいコンテスト

きょうとふのうりんすいさんぎじゅつ
京都府農林水産技術センター

よる あか 夜、明るいところにはいっぱい集まっていたり洗濯物についていたり、踏むとくさい嫌われ者???
そんなカメムシを何種類か集めてみました。それぞれ見た目が違うのはもちろん、“におい”も違う
のか？あなたにとってこの“におい”は“匂い”なのか？“臭い”なのか？それとも“香り”？
すこ た ど 少し立ち止まって、かいでいきませんか？

【カメムシのにおいコンテスト】

どのカメムシが一番臭い？一番臭いと思ったカメムシに投票しよう！
また、何のにおいに似ているかな？顕微鏡や虫めがねでカメムシの観察もしてみよう！

【コンテストにエントリーしたカメムシたち】飛び入り参加者もいるかも…？

おも かじゅ 主に果樹（くだもの）に害を与えるカメムシ

チャバネアオカメムシ



ツヤアオカメムシ



クサギカメムシ



おも まめるい だいず あずき がい あた 主に豆類（大豆や小豆）に害を与えるカメムシ

ホソヘリカメムシ



アオクサカメムシ



ミナミオアオカメムシ



さんごう 参考

カメムシの中には果樹（くだもの）や豆類（大豆や小豆など）、お米などの実の汁を吸って被害を出す、農業害虫になる種類があります。

そこで、京都府農林水産技術センター農林センター環境部（京都府病害虫防除所）では、フェロモントラップ（においを使ってカメムシを集めるわな）、予察灯トラップ（光を使ってカメムシを集めるわな）を設置して、集めたカメムシの数を調べています。カメムシの数が多くなり、農作物の被害が増えると予想されるときには注意喚起を行っています。